


●図表1

臨床薬剤室(7病棟9名体制)										製剤室(薬剤師7名・補助2名)								
8:00																		
9:00										注射	DI	内服	ケモMix	内服	調剤補助			
10:00	4南病棟	3南病棟	3新南病棟	2南病棟	2新南病棟	2西病棟①	2西病棟②	2東病棟	外来化学療法									
11:00																		
12:00																		
13:00	休憩	休憩	休憩	休憩	休憩	休憩	休憩	休憩	休憩	休憩			休憩		休憩			
14:00										注射	休憩	休憩	内服	内服	薬局事務			
15:00	4南病棟	3南病棟	3新南病棟	2南病棟	2新南病棟	2西病棟①	2西病棟②	2東病棟	病棟サブ		TPN Mix	DI				注射	内服	薬剤補助
16:00																		
17:00																		
18:00																		

●図表2 後発医薬品使用割合推移(平成27年～平成28年)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
平成27年	61.3%	62.4%	59.4%	62.5%	68.5%	61.4%	68.2%	71.3%	69.6%	77.7%	82.6%	80.9%	68.8%
平成28年	84.8%	80.2%	85.3%	83.4%	88.5%	86.3%	86.8%	87.7%	88.3%	89.6%	90.9%	89.0%	86.7%



●図表3 学術発表(平成28年)

学会名	演題	発表者
日本病院薬剤師会 関東ブロック第46回学術大会	職員へのオセルタミビル予防投与に関する取り組み	宇野啓一
日本医療薬学会 第26回年会	当院におけるアセトアミノフェン静注液の使用状況調査 ～適正使用と肝機能障害に着目して～	小野寺聖子