

がん種		レジメン名称		1コース期間	
膵臓癌		GEM 3投1休		4wks/kur	
適応分類		進行/再発癌 局所療法	術後補助化学療法 胆道癌は進行/再発癌のみ	術前 補助化学療法	
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)	
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28	
				↓	↓

がん種		レジメン名称		1コース期間	
膵臓癌		GEM 隔週		4wks/kur	
適応分類		進行/再発癌 局所療法	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法	
分類	抗がん剤名	1回投与量	投与方法	投与日 (Day)	
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28	
				↓	↓

がん種		レジメン名称		1コース期間	
膵臓癌		GEM+S-1療法		3wks/kur	
適応分類		進行/再発癌 局所療法	術後 補助化学療法	術前 補助化学療法	
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)	
	軽度	GEM	1000 mg/m <sup>2</sup>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21 ... 28	
				↓	↓
	軽度	S-1	60~ 100mg 日	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	

がん種		レジメン名称		1コース期間																																		
膵臓癌		GEM+nab-PAC療法		4wks/kur																																		
適応分類	進行/再発癌		術後 補助化学療法		術前 補助化学療法																																	
	局所療法																																					
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...	21	...	28																	
炎症	軽度	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	↓																																↓		
壊死	軽度	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125 mg/m <sup>2</sup>	↓																																↓		

がん種		レジメン名称		1コース期間																																			
膵臓癌		FOLFIRINOX療法		2wks/kur																																			
適応分類	進行/再発癌		術後 補助化学療法		術前 補助化学療法																																		
	局所療法																																						
分類	催吐 リスク	抗がん剤名	1回投与量	投与日 (Day)																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...	21	...	28																		
炎症	中等度	オキサリプラチン	1000 mg/m <sup>2</sup>	↓																																↓			
炎症	中等度	イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	↓																																	↓		
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	↓																																	↓		
炎症	軽度	5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	↓																																↓			
炎症	軽度	5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	↓	↓																															↓	↓		