当院登録レジメー一覧

当院でがん化学療法を受ける患者さんの適正な投与管理を目的として、医療関係者を対象に、標準的なレジメーを公開しています。

また、患者さんの状態等によって、抗がん薬の投与量、投与スケジュールなどは変更される場合があります。

がん種	がん種
胃がん	がん種横断的
大腸がん	神経内分泌がん
肝・胆・膵臓がん	原発不明がん
尿路上皮がん	非小細胞がん
前立腺がん	小細胞がん
腎細胞がん	乳がん (トラスツマブ含む)
精巣腫瘍	乳がん (トラスツマブ含まない)
	頭頸部がん

【レジメー情報の問い合わせ先】

壮幸会 行田総合病院 薬剤課

2025年5月作成

保険医療機関および保険薬局からのレジメーに関する照会や患者さんの状況に関する相談および情報提供等に応じる体制を整えております。ご質問・ご不明な点がございましたら、薬剤課までお問い合わせください。

胃がん

対象	レジメー番号	レジメー名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日 (day)	1コース期間
胃がん	8	S-1+CDDP療法	シスプラチン S-1	60 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	8 1~21	35日間
胃がん	22	weekly PTX療法	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
胃がん	29	nab-PTX療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
胃がん	34	SOX療法	オキサリプラチン S-1	100 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
胃がん	39	XP+TRA(8mg/kg)療法 XP+TRA(6mg/kg)療法	トラスツマブ シスプラチン カベシタピン	初回 8 mg/kg, 以降 6 mg/kg 80 mg/m ² 2000 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
胃がん	40	ラムシルマブ+weekly PTX療法	ラムシルマブ パクリタキセル	8 mg/kg 80 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 15 1, 8, 15	28日間
胃がん	47	XELOX(CapeOX)療法	オキサリプラチン カベシタピン S-1	130 mg/m ² 2000 mg/m ² /day 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口 経口	1 1~14 1~14	21日間
胃がん	48	CPT-11療法	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	1	14日間
胃がん	50	nab-PTX療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	1,8,15	28日間
胃がん	51	Nivolumab療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	14日間
胃がん	51	Nivolumab療法(4週)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	1	14日間
胃がん	53	SOX+TRA(8)療法 SOX+TRA(6)療法	トラスツマブ オキサリプラチン S-1	初回 8 mg/kg, 以降 6 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
胃がん	55	mFOLFOX6療法	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1~2	14日間
胃がん	92	RAM	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	1	14日間
胃がん	104	T-DXd療法	トラスツマブ デルクステカン	6.4 mg/kg	点滴静注	1	21日間
胃がん	120	トリフルリジン+RAM療法	ラムシルマブ トリフルリジン・チピラシル	8 mg/kg 70 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1, 15 1~5, 8~12	28日間
胃がん	120	RAM+CPT-11療法	ラムシルマブ イリノテカン	8 mg/kg 150 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1	14日間
胃がん	122	SOX+Nivo療法	ニボルマブ オキサリプラチン S-1	360 mg/body 130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
胃がん	123	mFOLFOX6+Nivo療法	ニボルマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	240 mg/body 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
胃がん	124	DTX+RAM療法	ドセタキセル ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	1, 15	
胃がん	134	DS療法	ドセタキセル S-1	40mg/m ² 80 mg/m ² /day	経口 点滴静注	1 1~14	21日間

大腸がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
大腸がん	1	mFOLFOX6療法	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	2	FOLFIRI療法	レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	12	XELOX療法	オキサリプラチン カペシタピン	130 mg/m ² 2000 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
大腸がん	6	IRIS療法	イリノテカン S-1	125 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1,15 1~14	28日間
大腸がん	23	(切除不能進行・再発)SOX療法	オキサリプラチン S-1	130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	21日間
大腸がん	45	RAM+FOLFIRI療法	ラムシルマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	52	Afli + FOLFIRI療法	アフリベルセプトベータ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	4 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	105	NIVO+IPI療法	ニボルマブ イピリムマブ	240 mg/body 1 mg/kg	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
大腸がん	127	HER+PER療法	トラスツズマブ ヘルツズマブ	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg 初回 840 mg, 2 回目以降 420 mg	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
大腸がん	41	Bev(5)+mFOLFOXIRI療法	ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 120 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	3	Bev(5)+mFOLFOX6療法	ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	20	Bev(5)+mFOLFOX6療法 アレルギー-レジメン	ベバシズマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	4	Bev(5)+FOLFIRI療法	ベバシズマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	41	Bev(5)+FOLFOXIRI療法	ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	5 mg/kg 165 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 3200 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	108	TAS-102+Bev(5)療法	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	5 mg/kg 70 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1, 15 1~5, 8~ 12	28日間
大腸がん	14	Bev(7.5)+XELOX療法	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタピン	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
大腸がん	101	Bev(7.5)+IRIS療法	ベバシズマブ イリノテカン S-1	7.5 mg/kg 125 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間

大腸がん	24	Bev(7.5)+SOX療法	ベバシズマブ オキサリプラチン S-1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~14	21日間
大腸がん	42	XELIRI	イリノテカン カペシタピン	200 mg/m ² 1600 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1 1~14	
大腸がん	18	biweekly アービタックス +FOLFOX療法	セツキシマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	500 mg/m ² 200 mg/m ² 130 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	129	biweekly アービタックス +CPT-11療法	セツキシマブ イリノテカン	500 mg/m ² 150 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1	14日間
大腸がん	35	Pani+CPT-11療法	パニツムマブ イリノテカン	6 mg/kg 150 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1	14日間
大腸がん	137	エンコラフェニブ+ピメチニブ +Cmab療法	セツキシマブ エンコラフェニブ ピメチニブ	初回 400 mg/ m ² , 以降 250 mg/m ² 300 mg/body/day 90 mg/body/day	点滴静注 経口 経口	1 連日 連日	7日間
大腸がん	107	エンコラフェニブ+セツキシマブ 療法	セツキシマブ エンコラフェニブ	初回 400 mg/ m ² , 以降 250 mg/m ² 300 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	7日間
大腸がん	25	ベクティビックス単独療法	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	1	14日間
大腸がん	16	Pani + mFOLFOX6療法	パニツムマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
大腸がん	17	Pani + FOLFIRI療法	パニツムマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間

肝細胞がん, 胆道がん, 膵がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日 (day)	1コース 期間
肝細胞がん	106	Atezo+BEV療法	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200 mg/body 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
肝細胞がん	140	トレメリムマブ+デュルバルマブ 療法	トレメリムマブ デュルバルマブ	300 mg/body 1500 mg/body	点滴静注 点滴静注	1 1	28日間 (1コース)
胆道がん	31	GEM+CDDP療法	ゲムシタピン シスプラチン	1000 mg/m ² 25 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8 1, 8	21日間
胆道がん	141	GCS療法 (GEM+CDDP+S-1)	ゲムシタピン シスプラチン S-1	1000 mg/m ² 25 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~7	14日間
胆道がん	136	GC+デュルバルマブ療法	デュルバルマブ ゲムシタピン シスプラチン	1500 mg/body 1000 mg/m ² 25 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1, 8 1, 8	21日間
胆道がん	36	GEM + S-1療法	ゲムシタピン S-1	1000 mg/m ² 60 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1, 8 1~14	21日間
膵がん	3	GEM療法(3投1休)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
膵がん	9	GEM療法(隔週)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
膵がん	36	GEM + S-1療法 (術前補助化学療法)	ゲムシタピン S-1	1000 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1, 8 1~14	21日間
膵がん	38	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85 mg/m ² 180 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
膵がん	37	GEM + nab-PTX療法	ゲムシタピン アルブミン懸濁型パクリタキセル	1000 mg/m ² 125 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8, 15 1, 8, 15	28日間
膵がん	100	nal-IRI+5FU/l-LV療法	イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1	14日間
膵・消化管神経内分泌腫瘍	96	ストレプトゾシン療法	ストレプトゾシン	500 mg/m ²	点滴静注	1, 2, 3, 4, 5	42日間

尿路上皮がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
尿路上皮がん	49	GEM+CBDCA変法療法	ゲムシタピン カルボプラチン	1000 mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注	1, 8 2	21日間
尿路上皮がん	11	GC療法(3週)	ゲムシタピン シスプラチン	1000 mg/m ² 70 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8 2	21日間
尿路上皮がん	83	Pembrolizumab療法(3週)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	1	21日間
尿路上皮がん	83	Pembrolizumab療法(6週)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	1	42日間
尿路上皮がん	110	Avelumab療法	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注	1	14日間
尿路上皮がん	126	EV療法	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	点滴静注	1, 8, 15	28日間
尿路上皮がん	128	術後Nivolumab療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	14日間
尿路上皮がん	128	術後Nivolumab療法(4週)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	1	28日間

前立腺がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
前立腺がん	10	DOC75療法	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
前立腺がん	46	カバジタキセル療法	カバジタキセル	25 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
前立腺がん		Darolutamide+DOC75療法	ドセタキセル ダロルタミド	75 mg/m ² 1回600 mgを1日2回	点滴静注 経口	1 連日	21日間 DOCは6コースまで

腎細胞がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
腎細胞がん	98	NIVO+IPI療法	ニボルマブ イピリムマブ	240 mg/body 1 mg/kg	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
腎細胞がん	99	AXI+Pembro療法(3週)	ペムブロリズマブ アキシチニブ	200 mg/body 10 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	21日間
腎細胞がん	109	AVE+AXI療法	アベルマブ アキシチニブ	10 mg/kg 10 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	14日間
腎細胞がん	99	AXI+Pembro療法(6週)	ペムブロリズマブ アキシチニブ	400 mg/body 10 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	42日間
腎細胞がん	132	Nivo+Cabo療法(2週)	ニボルマブ カボザンチニブ	240 mg/body 40 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	14日間
腎細胞がん	132	Nivo+Cabo療法(4週)	ニボルマブ カボザンチニブ	480 mg/body 40 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	28日間
腎細胞がん	135	Pembro+レンバチニブ療法(3週)	ペムブロリズマブ レンバチニブ	200 mg/body 20 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	21日間
腎細胞がん	135	Pembro+レンバチニブ療法(6週)	ペムブロリズマブ レンバチニブ	400 mg/body 20 mg/body/day	点滴静注 経口	1 連日	42日間

精巣腫瘍

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
精巣腫瘍	13	BEP療法	シスプラチン エトポシド ブレオマイシン	20 mg/m ² 100 mg/m ² 30 mg/body	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 8, 15	21日間
精巣腫瘍	144	Carbo7療法	カルボプラチン	AUC 7	点滴静注	1	21日間

がん種横断的

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
MSI-High固形癌	57	Pembrolizumab療法(3週)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	1	21日間
MSI-High固形癌	57	Pembrolizumab療法(6週)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	1	42日間
TMB-High固形癌	57	Pembrolizumab療法(3週)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	1	21日間
TMB-High固形癌	57	Pembrolizumab療法(6週)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	1	42日間

神経内分泌がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
NEC	139	CBDCA+VP-16療法(AUC 5)	カルボプラチン イトボシド	AUC 5 80 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 2, 3	21日間
NEC	138	CBDCA+CPT-11療法	カルボプラチン イリノテカン	AUC 5 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 2, 3	21日間
NET	96	ストレプトゾシン療法	ストレプトゾシン	500 mg/m ²	点滴静注	1, 2, 3, 4, 5	42日間

原発不明がんなど

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
原発不明がん	116	CBDCA+PTX療法	パクリタキセル カルボプラチン	200 mg/m ² AUC 6	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
原発不明がん	125	Nivolumab療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	14日間
原発不明がん	125	Nivolumab療法(4週)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	1	28日間

非小細胞肺癌

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
非小細胞肺癌	88	高齢者VNR(25)療法	ビノレルピン	25 mg/m ²	点滴静注	1, 8	28日間
非小細胞肺癌	89	GEM療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	1, 8	21日間
非小細胞肺癌	90	CBDCA+nab-PTX療法	カルボプラチン アルブミン懸濁型パクリタキセル	AUC 6 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 8, 15	21日間
非小細胞肺癌	74	CBDCA+PEM療法	カルボプラチン ペムトレキセド	AUC 6 500 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
非小細胞肺癌	84	CDDP+PEM療法(Short Hydration)	シスプラチン ペムトレキセド	75 mg/m ² 500 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
非小細胞肺癌	86	RAM+DTX療法	ラムシルマブ ドセタキセル	10 mg/kg 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
非小細胞肺癌	85	CBDCA+PTX+Bev療法	カルボプラチン パクリタキセル ベバシズマブ	AUC 6 200mg/m ² 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1 1	21日間
非小細胞肺癌	82	Atezo+PTX+CBDCA+Bev療法	アテゾリズマブ パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	1200 mg/body 200 mg/m ² AUC 6 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1 1 1	21日間
非小細胞肺癌	81	Pembro+PEM+CBDCA療法	ペムブロリズマブ ペムトレキセド カルボプラチン	200 mg/body 500 mg/m ² AUC 5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1 1	21日間
非小細胞肺癌	97	Pembro+nab-PTX+CBDCA療法	ペムブロリズマブ アルブミン懸濁型パクリタキセル カルボプラチン	200 mg/body 100 mg/m ² AUC 6	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1, 8, 15 1	21日間
非小細胞肺癌	91	Pembrolizumab療法(3週)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	1	42日間
非小細胞肺癌	91	Pembrolizumab療法(6週)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	1	42日間
非小細胞肺癌	87	Nivolumab療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	28日間
非小細胞肺癌	87	Nivolumab療法(4週)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	1	28日間

小細胞肺がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日 (day)	1コース期間
小細胞肺がん	79	Amurubicin療法	アムルビシン	40 mg/m ²	点滴静注	1, 2, 3	21日間
小細胞肺がん	76	CBDCA+VP-16療法	カルボプラチン イトポシド	AUC 5 80 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 2, 3	21日間
小細胞肺がん	77	CDDP+VP-16(EP)療法 (Short hydration)	シスプラチン イトポシド	80 mg/m ² 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 2, 3	21日間
小細胞肺がん	78	CDDP+CPT-11療法 (Short hydration)	シスプラチン イリノテカン	60 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 8, 15	28日間
小細胞肺がん	80	NGT療法	ノギテカン	1.0 mg/m ²	点滴静注	1, 2, 3, 4	21日間
小細胞肺がん	156	CBDCA+VP-16+Dur療法	カルボプラチン イトポシド デュルバルマブ	AUC 5 100 mg/m ² 1500 mg/body	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1, 2, 3 1	21日間
小細胞肺がん	94	CBDCA+VP-16+Atezo療法	カルボプラチン イトポシド アテゾリズマブ	AUC 5 100 mg/m ² 1200 mg/body	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1, 2, 3 1	21日間
小細胞肺がん	95	Atezo療法	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	1	21日間

乳がん (トラスツズマブを含むレジメン)

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日 (day)	1コース期間
乳がん	62	TRA+VNR療法	トラスツズマブ ビンルルビン	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg 25 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 8	21日間
乳がん	63	TRA単独療法	トラスツズマブ	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん	66	TRA+エリブリン療法	トラスツズマブ エリブリン	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg 1.4 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1 1, 8	21日間
乳がん	68	TRA+PER療法 +DTX(75)療法	トラスツズマブ ペルツツマブ ドキタキセル	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg 初回 840 mg, 2 回目以降 420 mg 75 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1 1	21日間
乳がん	119	TRA+PER療法+PTX連続 療法	トラスツズマブ ペルツツマブ パクリタキセル	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg 初回 840 mg, 2 回目以降 420 mg 80 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1 1, 8, 15	21日間
乳がん	65	T-DM1療法 (転移再発)	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注	1	21日間
乳がん	127	TRA+PER療法	トラスツズマブ ペルツツマブ	初回 8 mg/kg, 2 回目以降 6 mg/kg 初回 840 mg, 2 回目以降 420 mg	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間

乳がん (トラスツズマブを含まないレジメン)

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日 (day)	1コース期間
乳がん	64	DTX60療法	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
乳がん	61	VNR25療法	ビンルルビン	25 mg/m ²	点滴静注	1, 8	21日間
乳がん	60	FEC療法	フルオロウラシル エピルビシン シクロホスファミド	500 mg/m ² 100 mg/m ² 500 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1, 8 1, 8 1, 8	28日間
乳がん	59	DTX+CPM療法	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/m ² 600 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8 1	21日間
乳がん	69	GEM単独療法	ゲムシタピン	1250 mg/m ²	点滴静注	1, 8	21日間
乳がん	67	エリブリン療法	エリブリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	1, 8	21日間
乳がん	58	Bev (10)+Weekly PTX 療法	ベバシズマブ パクリタキセル	10 mg/kg 90 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 15 1, 8, 15	28日間
乳がん	93	atezo+nab-PTX療法	アテゾリズマブ アルブミン懸濁型パクリタキセル	840 mg/body 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 15 1, 8, 15	28日間

頭頸部がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
頭頸部がん	70	Cetu+FP療法	セツキシマブ 5-FU CDDP	初回 400 mg/m ² , 以降 250 mg/m ² 80 mg/m ² 80 mg/m ²	点滴静注	1	日間
頭頸部がん	71	Nivolumab療法(2週)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	1	14日間
頭頸部がん	73	DTX	ドセタキセル	60 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
頭頸部がん	72	wPTX	パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
頭頸部がん	115	Pembrolizumab療法	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	1	21日間